BIBLIOGRAFIA. — YOUNG, D. A., 1952. *A Reclassification of Western Hemisphere Typhlocybinae (Homoptera, Cicadellidae).* Univ. Kansas Sci. Bull., 35 (1): 1-217.

Se trata de un importante trabajo de reclasificación de los Tiflocibinos (para algunos autores elevados a la jerarquía taxonómica de familia) del nuevo mundo, ejecutado con toda la minuciosidad que exige esta subfamilia, en el estudio de la cual a los inconvenientes propios del pequeño tamaño de sus representantes hay que agregar la imperiosa necesidad de realizar en todos los casos el examen del aparato genital macho. No es exageración alguna lo que expreso sobre la necesidad de estudiar los genitales ejemplar por ejemplar, pues son numerosas las especies que son indistinguibles externamente, basta para ello citar lo que dice Oman en *New Neotropical Empoascan Leafhoppers.* Jour. Wash. Acad. Sci. 26 (1) 34-40, 1936: *Empoasca peregrina* Oman, pareciéndose a *E. trifasciata* (Gillette), *E. rubraza* Oman, pareciéndose aparentemente a las especies de Osborn *E. picta, E. decorata* y *E. rubromaculata, E. trifurcata* Oman, indistinguible externamente a *E. fabae* (Harris), *E. curveola* Oman, externamente indistinguible de *E. trifurcata, E. missiona* Oman, externamente indistinguible de *E. trifurcata, E. insularis* Oman, superficialmente idéntica con *E. trifurcata.* Young considera cuatro Tribus, una de las cuales es nueva, la de los *Erythroneurini,* y trata 58 géneros, de los cuales 26 son nuevos para la ciencia, además de seis nuevos subgéneros, siendo ellos: *Hadralebra, Rabela, Orsalebra, Balera, Diceratalebra, Trypanalebra, Brunerella, Habralebra, Elabra, Rhabdotalebra, Protalebrella, Endoxoneura, Kidrella, Donidia, Dikrellidia, Kunzella, Neodikrella, Sarascarta, Buritia, Saranella, Eupteroidea, Henribautia, Ossiannilssonia, Neojoruma, Paulomanus, Beamerana, Dikraneura (Delongia), Dikrella (Readionia), Erythroneura (Erasmoneura), Erythroneura (Eratoneura), Erythroneura (Erythridula), Joruma (Jorumidia),* agregando además numerosas nuevas sinonimias y elevando al subgénero *Scinda* De Long y Ruppel a la categoría de género. Con respecto a la rehabilitación del género *Dicranoneura* Douglas, Metcalf expresa su desacuerdo al respecto (Proc. Ent. Soc. Wash. 55 (4) : 166, 1953). El presente trabajo crece en importancia porque el mismo presta verdadera utilidad en el reconocimiento de los diversos géneros por la inclusión de claves y un abundante material ilustrativo en el cual se ha dado capital importancia a la representación de las diferentes estructuras de los genitales ♂, elementos fundamentales para realizar las distintas identificaciones. — *B. A. Torres.*